

Памятка для родителей о туберкулинодиагностике



Многие ошибочно считают реакцию Манту прививкой, однако это не прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая определить напряженность иммунитета к туберкулезу и своевременно диагностировать заболевание у ребенка. Проба Манту проводится туберкулином – раствором осколков оболочек возбудителя туберкулеза (т. е. аллергеном, не вызывающим заболевания), который вводится в предплечье подкожно. Через три дня пробу измеряют.

При технически правильном внутрикожном введении туберкулина образуется "лимонная корочка", а затем при положительной реакции появляется папула, напоминающая внешне укус комара. У ребенка, привитого вакциной БЦЖ, реакция Манту в первые 4–5 лет обычно стойко положительная (свыше 5 мм, но не более 17 мм) и постепенно угасающая. Это нормальное явление, т. н. поствакцинальная аллергия.

Отрицательная реакция Манту у привитого ребенка означает неэффективную вакцинацию, и ребенку могут предложить повторную процедуру. Если реакция Манту нарастает более чем на 6 мм, или рядом появляются пузырьки, красная дорожка от пробы к локтю, или увеличиваются лимфоузлы, то это признаки т. н. виража туберкулиновых проб, т. е. инфицирования возбудителем туберкулеза. В подобных случаях ребенка обязательно направляют на консультацию к фтизиатру.

Не отказывайтесь от похода к специалисту. Фтизиатр выяснит, истинная это реакция или ложно-положительная, обследует ребенка и, возможно, назначит профилактическое лечение. Детская противотуберкулезная помощь направлена прежде всего на профилактику заболевания, потому что лечение туберкулеза продолжительное.

Помните, что при отсутствии заключения фтизиатра в течение месяца после направления ребенка, не обследованного на туберкулез, не рекомендуется допускать в детское образовательное учреждение, т. к. он может стать источником инфекции!!!

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2)

817. В целях раннего выявления туберкулеза у детей (до 14 лет включительно) проводится иммунодиагностика. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) проводят 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулеза детям начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно независимо от результата предыдущих проб, а также детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не ревакцинированным против туберкулеза, у которых при предыдущем обследовании проба Манту дала отрицательный результат. Остальным детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, при наличии противопоказаний, *in vitro* тесты, основанные на оценке высвобождения Т-лимфоцитами гамма-интерферона.

823. Дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации. Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Проба Манту — это прививка? НЕТ!
Проба Манту — это тест иммунитета на туберкулез? ДА!

Проба МАНТУ содержит специальные вещества, которые помогают увидеть, болен ребенок туберкулезом или нет. «ПУГОВКА» (немного покрасневший уплотненный участок кожи) — это реакция иммунитета.

- **Отрицательный**
«Пуговки» не видно, нет уплотнения и покраснения
- **Сомнительный**
«Пуговка» с уплотнением размером 2–4 мм, или только покраснение
- **Положительный**
«Пуговка» с уплотнением размером более 5 мм

Пробу Манту не рекомендуют смачивать водой, смазывать йодом или зеленкой, бинтовать или заклеивать лейкопластырем. Пробу Манту оценивают через 72 часа. Правильно это может сделать только специалист! Если результат не прочитан через трое суток, ни врач, ни родители не знают, есть ли угроза заболевания туберкулезом для ребенка.

Обязательно выполняйте все рекомендации врача!
Подробности на ПРОФИЛАКТИКА.РУ



**Проба Манту —
это прививка?
НЕТ!**

**Проба Манту —
это тест иммунитета
на туберкулез?**

ДА!

Проба МАНТУ содержит специальные вещества, которые помогают увидеть, болен ребенок туберкулезом или нет.
«ПУГОВКА» (немного покрасневший уплотненный участок кожи) — это реакция иммунитета.

— **Отрицательный**

«Пуговки» не видно, нет уплотнения и покраснения



— **Сомнительный**

«Пуговка» с уплотнением размером 2–4 мм, или только покраснение



— **Положительный**

«Пуговка» с уплотнением размером более 5 мм

Пробу Манту не рекомендуют смачивать водой, смазывать йодом или зеленкой, бинтовать или заклеивать лейкопластырем.

Пробу Манту оценивают через 72 часа. Правильно это может сделать только специалист! Если результат не прочитан через трое суток, ни врач, ни родители не знают, есть ли угроза заболевания туберкулезом для ребенка.

Обязательно выполняйте все рекомендации врача!

Подробности на ПРОФИЛАКТИКА.РУ